

foliQ[®]

BOR

Płynny nawóz dolistny do bezpiecznego zapobiegania niedoborom boru

FoliQ[®] Bor jest wysoko skoncentrowanym nawozem do prewencyjnego lub interwencyjnego zaopatrzenia roślin w bor w szybki i bezpieczny sposób.

FoliQ[®] Bor jest szczególnie polecany do dokarmiania dolistnego upraw rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy, ziemniaków oraz warzyw i upraw sadowniczych. Niedobory tego makroelementu skutkują:

- w uprawie buraka cukrowego – zgorzelą liści sercowych oraz suchą zgnilizną korzeni,
- w rzepaku – pękaniem łodyg, pustymi przestrzeniami w pędach oraz mniejszą liczbą ziaren w łuszczyne,
- w uprawach drzew owocowych – pękaniem owoców, skorkowaceniem miąższu oraz przedwczesnym opadaniem owoców,
- w produkcji warzyw kapustnych – zahamowaniem wzrostu roślin, przejaśnieniami na liściach.

MIKROELEMENTY

g/l

Bor (B)* 150

* w formie boroetanoaminy, całkowicie rozpuszczalny w wodzie

Gęstość 1,36 kg/l, pH 7,0 – 8,0



foliQ[®]

BOR

150 g/l boru w postaci boroetanoaminy



Producent:
Agrii Polska Sp. z o.o.
ul. Obornicka 233
60-650 Poznań
tel. 61 8429466

Kluczowe zalety

- forma płynna zapewnia idealne rozpuszczanie nawozu w wodzie w dowolnym stężeniu
- łatwe i bezpieczne dozowanie nawozu
- szybkie pobieranie oraz przemieszczanie boru w roślinach
- dobra mieszalność ze wszystkimi powszechnie używanymi środkami ochrony roślin oraz innymi nawozami **FoliQ®**
- brak nadmiernej alkalizacji cieczy roboczej

Najważniejsze korzyści

- wyższa odporność roślin na choroby
- poprawa rozwoju oraz kwitnienia roślin
- pozytywny wpływ na zapylenie, zapłodnienie i zawiązanie nasion
- prawidłowa gospodarka auksynami
- prawidłowy transport cukrów w roślinach
- poprawa zimotrwałości
- zwiększenie ilości oraz poprawa jakości plonu

Dawki i terminy stosowania

Uprawa	Niedobór ukryty = średnie zapotrzebowanie		Niedobór widoczny = wysokie zapotrzebowanie		Terminy stosowania
	Liczba zabiegów	Dawka l/ha	Liczba zabiegów	Dawka l/ha	
Rzepak	2	1	2 – 3	1,5	w fazie intensywnego wzrostu
Burak cukrowy	2	1	2 – 3	1,5	
Kukurydza	1 – 2	1	2	1,5	
Ziemniaki	1 – 2	1	2	1,5	
Warzywa kapustne	2	1	2 – 3	1,5	
Marchew, seler	2	1	2 – 3	1,5	
Tytoń	1	1	2	1,0	

	Dawka l/ha	Liczba zabiegów i terminy stosowania
Owoce ziarnkowe	1 – 2	3 zabiegi: pierwszy – w fazie zielonego pąka, drugi – w fazie opadania płatków, trzeci – po zbiorach
Owoce pestkowe	1	3 zabiegi: pierwszy – w fazie zielonego pąka, drugi – w fazie opadania płatków, trzeci – po zbiorach
Truskawki	2	1 zabieg: bezpośrednio przed kwitnieniem

Uwaga! Produkt stosować tylko w razie wystąpienia niedoborów boru. Nigdy nie przekraczać zalecanej dawki.

