

Podwójne uderzenie w chwasty!

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG). Środek zawiera dwie substancje czynne należące do grupy inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS) co powoduje zahamowanie syntezy aminokwasów odgałęzionych, a tym samym prowadzi do zaburzeń w biosyntezie białek.

Środek pobierany jest głównie poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w roślinach. Zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów wrażliwych następuje w ciągu kilku godzin po zabiegu, jednak widoczne objawy działania pojawiają się po kilku dniach. Głównymi widocznymi objawami działania herbicydu na chwasty jest zahamowanie wzrostu, chlorozy (żółknięcie), a w konsekwencji nekrozy prowadzące do zamierania chwastów. W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka jest szybsze, natomiast w warunkach niskich temperatur (około 50°C) zniszczenie chwastów dwuliściennych następuje po około 3 tygodniach, a chwastów jednoliściennych nawet po 6-9 tygodniach. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 50°C. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Główne zalety produktu

- + Zwalcza zarówno chwasty dwuliścienne oraz jednoliścienne takie jak miotła zbożowa i wyczyniec polny, życice i stokłosę polną.
- + Dwie substancje aktywne= podwójne uderzenie w chwasty!
- + Pierwsze objawy zahamowania wzrostu chwastów widoczne już po kilku godzinach!
- + Elastyczna dawka preparatu, elastyczny termin stosowania

Substancja aktywna

florasulam - 14,2g
piroksulam - 70,8g

Dawka

170 – 265 g/ha

Uprawy

pszenżyto ozime, pszenica ozima, żyto



CORELLO

Podwójne uderzenie w chwasty!



- + Zwalcza zarówno chwasty dwuliścienne oraz jednoliścienne takie jak mniątka zbożowa i wyczyniec polny, życice i stokłosę polną.
- + Dwie substancje aktywne = podwójne uderzenie w chwasty!
- + Pierwsze objawy zahamowania wzrostu chwastów widoczne już po kilku godzinach!
- + Elastyczna dawka preparatu, elastyczny termin stosowania

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

www.agrii.pl

Agrii™