

FoliQ BorMnS

Wysoko skoncentrowany krystaliczny nawóz, zawierający **bor, mangan, siarkę azot i potas.**

Nawóz idealnie nadaje się do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w uprawie rzepaku, buraków słonecznika i ziemniaków. Bor zawarty w nawozie **FoliQ BorMnS** odpowiada za przygotowanie rzepaku do spoczynku zimowego, stymuluje rozwój korzeni i proces kwitnienia. Mangan i siarka mają istotny wpływ na metabolizm azotu w roślinie.

Dzięki krystalicznej formie i wysokiej jakości komponentów używanych do produkcji **FoliQ BorMnS**, składniki odżywcze zawarte w nawozie są łatwo i szybko pobierane przez rośliny, a ich mnogość ułatwia wykonanie optymalnego nawożenia dolistnego wielu upraw. Produkt całkowicie się rozpuszcza, a bor w formie kwasu borowego, nie podnosi pH mieszanin w opryskiwaczu, co jest bardzo istotne zwłaszcza w kontekście łącznego stosowania nawozu borowego z insektycydem.



FoliQ BorMnS	g/kg
Bor	79
Mangan	154
Siarka (SO ₃)	252
Potas (K ₂ O)	12
Azot (N)	10

KLUCZOWE ZALETY:

- + skuteczność nawozu w niskich dawkach
- + wysoka koncentracja składników w kilogramie
- + efektywne pobieranie składników w szerokim zakresie temperatur powietrza i gleby
- + wysokie bezpieczeństwo dla roślin uprawnych
- + całkowita rozpuszczalność produktu
- + produkt się nie zbryla

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

- + właściwy wzrost i rozwój roślin
- + efektywna gospodarka azotem i pozostałymi makroelementami
- + rozbudowany i aktywny system korzeniowy
- + prawidłowy pokrój rozety rzepaku ozimego w fazie jesiennego wzrostu
- + intensywne kwitnienie
- + wyższa odporność na choroby
- + lepsze przygotowanie ozimin do spoczynku, wyższa mrozoodporność
- + wyższe zaolejenie nasion rzepaku
- + wyższa zawartość cukru w burakach cukrowych
- + większa tolerancja na okresowe niedobory wody
- + wyższy plon lepszej jakości

DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

Uprawa	Dawka kg/ha	Liczba zabiegów i terminy stosowania
Rzepak	2	2 zabiegi: jesienią – od fazy 4 liści do 2 tygodni przed końcem wegetacji jesiennej, wiosną – od fazy wydłużania łodygi do zwartego zielonego pąka
Burak i słonecznik	2	1 – 2 zabiegi: od fazy 4 liści, przy większym niedoborze zabieg powtórzyć po 10 – 14 dniach
Ziemniaki	2	1 – 2 zabiegi: od fazy 4 liści do początku kwitnienia, przy większym niedoborze zabieg powtórzyć po 10 – 14 dniach