

# FoliQ Calmax

Skoncentrowany nawóz do bezpiecznego i wysoko efektywnego nawożenia **wapniem oraz mikroelementami** roślin sadowniczych i warzywniczych.

Dzięki korzystnemu odczynowi oraz optymalnym zawartościom makro i mikroelementów **FoliQ Calmax** jest znacznie lepiej wykorzystywany i tolerowany przez rośliny niż wapniowe nawozy jednoskładnikowe np. chlorek wapnia.

Zbilansowany skład produktu powoduje wzrost zdolności przechowalniczych oraz wartości handlowej warzyw i owoców.

**FoliQ Calmax** idealnie nadaje się do ograniczania strat w plonach powodowanych chorobami fizjologicznymi takimi jak: gorzka plamistość podskórna, tipburn czy suche zgnilizny wierzchołkowe pomidorów i papryki.



FoliQ Calmax	g/l	Zawartość % wagowa
Wapń (CaO)	210	15
Azot	140	10
Magnez (MgO)	33,2	2,29
Bor	1	0,072
Chelat manganu	1,1	0,081
Chelat cynku	0,28	0,02
Chelat miedzi	0,47	0,034
Molibden	1	0,072
Chelat żelaza	0,45	0,032



ANTYODPARO-  
WYWCZE



SURFAKTANTY



HUMEKTANTY



MIESZALNOŚĆ  
ZE ŚRODKAMI  
OCHRONY ROŚLIN



CHELATOWANIE  
EDTA



ŚRODKI  
ZWIĘKSZAJĄCE  
PRZYCZEPNOŚĆ

## KLUCZOWE ZALETY:

- + wysoka koncentracja wapnia uzupełniona o makro i mikroelementy, które podnoszą przyswajalność wapnia
- + całkowita rozpuszczalność nawozu
- + poprawa właściwości cieczy roboczej w opryskiwaczu
- + możliwość zastosowania produktu w wielu gatunkach roślin
- + wysokie bezpieczeństwo dla roślin uprawnych

## NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

- + ograniczanie deficytu wapnia
- + podwyższona odporność roślin na choroby grzybowe
- + skuteczne zapobieganie pękaniu owoców pestkowych
- + zwiększona jędrność owoców
- + poprawa zdolności przechowalniczych owoców i warzyw
- + wyższa zdrowotność roślin
- + zwiększenie plonu i poprawa jego jakości

## DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

Uprawa	Dawka l/ha	Liczba zabiegów i terminy stosowania
Drzewa ziarnkowe	2 – 5	1 – 4 zabiegi: w okresie wzrostu zawiązków i owoców
Drzewa pestkowe	3 – 6	3 – 4 zabiegi: od zawiązywania owoców
Brzoskwinie	3 – 6	3 – 4 zabiegi: od zawiązywania owoców
Truskawki	3 – 6 (max 3%)	2 – 3 zabiegi: od zawiązywania owoców
Sałata, cykoria	4 – 5	2 – 3 zabiegi: od drugiego tygodnia po wysadzeniu
Pomidory, papryka, ogórki	4 – 5 (0,1% pod osłonami)	2 – 3 zabiegi: od zawiązywania owoców
Warzywa kapustne	4 – 5	2 – 3 zabiegi: od początku zawiązywania główek/róż
Inne warzywa w uprawach polowych	4 – 5	2 – 3 zabiegi: w sezonie wegetacyjnym

Gęstość 1,40 kg/l, pH 6,0 – 7,0