

FoliQ Makro PK

Wysoko skoncentrowany, zawieszinowy nawóz fosforowo-potasowy z dodatkiem mikroelementów do dokarmiania wielu gatunków roślin uprawnych.

FoliQ Makro PK jest szczególnie polecany do stosowania jesienią lub wczesną wiosną oraz w okresach, w których niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak np.: niskie temperatury, nadmiar wilgoci, susza, ograniczają pobieranie fosforu i potasu z gleby.

Odpowiednio zbilansowany skład oraz nowoczesna formuła zapewniają szybkie i efektywne zaopatrzenie roślin w makro i mikroelementy niezbędne do prawidłowego rozwoju oraz zachowania dobrego poziomu zdrowotności upraw.



FoliQ Makro PK	g/l	Zawartość % wagowa
Azot	120	8
Potas (K_2O)	240	16
Fosfor (P_2O_5)	240	16
Bor	0,45	0,03
Chelat manganu	0,45	0,03
Chelat cynku	2,25	0,15
Chelat miedzi	0,6	0,04
Chelat żelaza	0,21	0,014
Molibden	0,11	0,008



ANTYODPARO-
WYWCZĘ



SURFAKTANTY



HUMEKTANTY



MIESZALNOŚĆ
ZE ŚRODKAMI
OCHRONY ROŚLIN



CHELATOWANIE
EDTA



ŚRODKI
ZWIĘKSZAJĄCE
PRZYCZEPNOŚĆ

KLUCZOWE ZALETY:

- + wysoka koncentracja fosforu i potasu
- + dodatek szerokiej gamy mikroelementów
- + wszystkie składniki doskonale dostępne dla roślin
- + wysoki poziom mieszalności z pestycydami
- + poprawa właściwości cieczy roboczej w opryskiwaczu
- + możliwość zastosowania produktu w wielu gatunkach roślin
- + wysokie bezpieczeństwo dla roślin uprawnych

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

- + wspomaganie prawidłowej budowy systemu korzeniowego
- + doskonałe przygotowanie roślin do spoczynku zimowego w okresie jesiennym
- + prawidłowa, szybka regeneracja roślin w okresie wychodzenia ze spoczynku zimowego i po ustaniu warunków stresowych dla roślin
- + wyższy wigor roślin
- + prawidłowy wzrost i rozwój upraw
- + zwiększona odporność na okresowe niedobory wody
- + pięknie wybarwione i jędrne owoce
- + wzrost potencjału plonotwórczego roślin

DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

Uprawa	Dawka l/ha	Liczba zabiegów i terminy stosowania
Zboża ozime	2 – 3	2 zabiegi: jesienią – od fazy 3 – 4 liści do 2 tygodni przed końcem wegetacji jesiennej, wiosną – w momencie ruszenia wegetacji
Zboża jare	2 – 3	2 zabiegi: od fazy 3 – 4 liści do początku fazy kłoszenia
Rzepak ozimy	2 – 3	2 zabiegi: jesienią; od fazy 6 liści do 2 tygodni przed końcem wegetacji jesiennej, wiosną – w momencie ruszenia wegetacji
Buraki cukrowe	2 – 3	2 – 3 zabiegi: od fazy 4 – 6 liści do zwarcia międzyrzędzi, w odstępach 10 – 14 dni
Kukurydza	2 – 3	1 zabieg: w fazie szybkiego wzrostu (6 – 10 liść) kukurydzy
Ziemniaki	2 – 3	2 – 3 zabiegi: od fazy formowania pędów do fazy 40% masy końcowej bulw
Warzywa gruntowe	5	stosować od fazy 4 – 6 liści lub po przyjęciu się rozsady
Drzewa owocowe	3 – 5	kilka zabiegów: po kwitnieniu, w okresie wzrostu zawiązków i przed zbiorami, szczególnie w okresach niesprzyjających pobieraniu fosforu i/lub potasu z gleby
Jagodowe	3 – 5	kilka zabiegów: wczesną wiosną, po kwitnieniu i przed wybarwianiem się owoców, szczególnie w warunkach niesprzyjających pobieraniu fosforu i/lub potasu z gleby

Gęstość 1,50 kg/l, pH 5,0 – 6,0