

# TM BUTTARE

## Adiuwant zawierający w składzie olej mineralny z systemem emulgatorów: przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową środków mszyco- i przedziorkobójczych w różnych uprawach

- + wzmacnia działanie środków ochrony roślin w ograniczaniu występowania wirusów M i Y w uprawie ziemniaka
- + wzmacnia działanie środków mszyco- i przedziorkobójczych
- + preparat obniża napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieczy opryskowej
- + zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie wykonywania zabiegów opryskiwania
- + zwiększa aktywność preparatów systemicznych i kontaktowych
- + zmniejsza zmywalność środków ochrony roślin przez deszcz i rosę



Hasło ostrzegawcze:  
**Niebezpieczeństwo**

**H318**

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

**P280**

Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy

**P305+P351+P338**

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

**P310**

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem

### Producent:

Agrii Polska Sp. z o.o.  
ul. Obornicka 233  
60-650 Poznań  
Tel. 61 842 94 66  
www.agrii.pl

# 15l

### STOSOWANIE I DAWKA

#### ZIEMNIAK

W celu ograniczenia występowania mszyc zabieg wykonać w momencie, gdy wzeszło 70-90% roślin, następnie opryskiwać co 7-10 dni, aż do momentu kwitnienia.

zalecana dawka 1,5% v/v (1,5 litra na 100 litrów wody)  
zalecany wydatek cieczy 400 l/ha

#### UWAGI:

1. W przypadku temperatury powyżej 30°C oraz suszy zabieg wykonywać wieczorem.
2. Zabiegi wykonywać tylko na suche rośliny.
3. Do ochrony ziemniaka nie stosować środków zawierających miedź.

#### UPRAWY SADOWNICZE

Drzewa i krzewy owocowe - przedziorki i szpecie

Opryskiwać od początku wegetacji do pierwszych liści - najlepiej na początku wylęgu larw.

dawka 1,5% v/v (1,5 litra na 100 litrów wody) zalecany wydatek cieczy 500 l/ha w zależności od wielkości drzew

#### UWAGI:

1. Opryskiwać rośliny tak, aby ciecz nie spływała z pni i gałęzi.
2. Środek stosować w temperaturze powyżej 0°C, podczas bezwietrznej i bezdeszczowej pogody.

#### PRZYGOTOWANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do połowy jego objętości i włączyć mieszadło. Dodać środek ochrony roślin w ilości określonej w etykiecie-instrukcji stosowania. Następnie dodać odpowiednią ilość adiuwantu.

Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą przy włączonym mieszadle. Puste opakowanie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza.

#### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przestrzegać środków ostrożności obowiązujących dla insektycydów stosowanych łącznie z adiuwantem. Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane użyciem preparatu niezgodnym z instrukcją stosowania.

#### PRZECHOWYWANIE I USUWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 40°C z dala od produktów spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci i osób niepowołanych. Całkowicie opróżnione

opakowanie i usunąć w sposób bezpieczny.

W sytuacjach, w których wymagana jest pomoc medyczna inna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 349 28 31  
Rzeszów – (0-17) 866 40 25  
Kraków – (0-12) 411 99 99  
Sosnowiec – (0-32) 266 11 45  
Lublin – (0-81) 740 89 83

Tamów – (0-14) 631 51 77  
Łódź – (0-42) 657 99 00  
Warszawa – (0-22) 619 66 54  
Poznań – (0-61) 847 69 46  
Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności: 4 lata  
Data produkcji: na opakowaniu  
Nr partii: na opakowaniu