

TopSi

Nawóz dolistny będący unikalnym połączeniem **tytanu, krzemu i boru**.

TopSi wzmacnia ściany komórkowe roślin, dzięki czemu z jednej strony są one bardziej odporne na atak szkodników i chorób, a z drugiej strony łąn mniej wylega, ponieważ rośliny mają bardziej sztywny pokrój.

TopSi zwiększa intensywność fotosyntezy i pobieranie składników pokarmowych. W przypadku owoców bezpośrednio wpływa na poprawę jędrności i redukcję chorób pochodzenia fizjologicznego oraz na wyższą trwałość przechowalniczą roślin. Jedyne połączenie na rynku krzemu, tytanu i boru w jednym produkcie, korzystnie wpływa na odporność roślin na suszę.



TopSi	g/l
Krzem	21
Tytan	2,4
Bor	2,7

KLUCZOWE ZALETY:

- + wysoka zawartość krzemu i tytanu w jednym produkcie
- + wysokie rozdrobnienie składników, co podnosi efektywność zabiegu i rozpuszczalność produktu
- + szybki i efektywny transport substancji odżywczych w roślinie
- + wysokie bezpieczeństwo dla roślin
- + bardzo dobra mieszalność

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

- + regulacja transpiracji – ograniczenie stresów wodnych
- + poprawa plonowania, dzięki zawartości tytanu, który działa stymulująco na procesy fizjologiczne oraz boru, który stymuluje kwitnienie i zawiązywanie owoców
- + poprawa jędrności i trwałości owoców
- + rośliny nawożone krzemem lepiej znoszą niskie temperatury przez co są mniej wrażliwe na przymrozki
- + wyższy plon lepszej jakości

DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

Uprawa	Dawka l/ha	Liczba zabiegów i terminy stosowania
Owoce pestkowe	0,3	2 – 4 zabiegi: kilka zabiegów od fazy zielonego/białego pąka do 1 tygodnia przed zbiorem. Odstęp pomiędzy zabiegami 7 – 10 dni
Jabłoń, grusza	0,3	2 – 4 zabiegi: kilka zabiegów od fazy zielonego pąka do 1 tygodnia przed zbiorem. Odstęp pomiędzy zabiegami 7 – 10 dni
Warzywa	0,3	2 – 4 zabiegi: pierwszy zabieg po przyjęciu rozsady w fazie intensywnego wzrostu. W przypadku warzyw uprawianych z siewu pierwszy zabieg około 2 tygodnia po wschodach. Kolejne zabiegi po 10 – 14 dniach
Ziemniak	0,3	2 – 3 zabiegi: pierwszy zabieg wiosną, po uformowaniu redlin. Kolejny, 1 tydzień przed kwitnieniem
Burak cukrowy	0,3	2 – 3 zabiegi: pierwszy zabieg w fazie 6 liści. Odstęp pomiędzy zabiegami 7 – 10 dni
Kukurydza	0,3	2 – 3 zabiegi: 1 zabieg w fazie 5 – 6 liści. Kolejny po 10 – 14 dniach
Zboża	0,3	2 – 3 zabiegi: jesienią od fazy 3 liści do końca wegetacji. Wiosną po ruszeniu wegetacji. Odstęp pomiędzy zabiegami 10 – 14 dni
Rzepak	0,3	2 – 3 zabiegi: jesień od fazy 3 liści do końca wegetacji. Wiosną po ruszeniu wegetacji. Odstęp pomiędzy zabiegami 10 – 14 dni

Gęstość 1,34 kg/l