

BORA

Mikrobiologiczny promotor wzrostu roślin wpływający na zwiększenie plonów

Skład:

- + grzyb z rodzaju *Beauveria*, min. $6,0 \times 10^7$ CFU/g
- + perlit

Formulacja: WP – proszek do sporządzania zawiesiny wodnej

Nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO)

Środki ostrożności:

- P102** Chronić przed dziećmi.
- P264** Dokładnie umyć ręce po użyciu.
- P270** Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
- P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P284** „W przypadku nieodpowiedniej wentylacji” stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
- P302 + P352** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
- P305 + P351 + P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P362 + P364** Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
- P501** Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami

Producent:

BIOVÉD 2005 KFT
9922 Pinkamindszent, 140/23., Węgry.

Dystrybutor:

Agrii Polska Sp. z o.o.
ul. Obornicka 233
60-650 Poznań
tel. 61 842 94 66
www.agrii.pl

1 kg

Numer rejestracyjny wydany w kraju pochodzenia: 6300/555-1/2021

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Uprawy: preparat mikrobiologiczny BORA może być stosowany we wszystkich uprawach polowych i ogrodniczych, a także w leśnictwie, w celu poprawy warunków wzrostu roślin i zwiększenia plonów.

Termin stosowania: zastosowanie preparatu płytko pod powierzchnię gleby, przed lub w obecności opadów deszczu (co najmniej 10 mm) lub irygacji, pomaga aktywować zarodniki grzyba w górnej 5-10 cm aktywnej warstwie gleby.

Preparat stosować w dawce 1,5-3,0 kg/ha.

Sposób stosowania: Produkt stosować dogłębnie. 1,0 kg produktu BORA należy zmieszać z minimum 200 litrami wody. By ułatwić sporządzanie mieszaniny dopuszczalne jest wcześniejsze rozpuszczenie preparatu w osobnym naczyniu podając 1 kg Bora na 10 l wody.

Taki zabieg przyspiesza aktywację grzyba. Produkt podlega sedymentacji, dlatego opryskiwacz musi być wyposażony w wewnętrzny układ mieszania. W przypadku mniejszego zbiornika opryskiwacza regularnie wstrząsać. Stosować dysze rozpylające o większym rozmiarze, aby uniknąć ich zatykania. W celu uzyskania efektywnego działania środka, nie jest istotne zachowanie

równomiernego rozkładu rozpylania. Ponieważ produkt podlega sedymentacji, zalecane aby zawartość zbiornika irygacyjnego była mieszana podczas użycia roztworu, a prędkość wody w rurze irygacyjnej musi być jak najwyższa. Preparat zaleca się stosować w godzinach wieczornych by uniknąć promieniowania UV.

Częstotliwość użycia: aby utrzymać wysoką efektywność w glebie, zalecane jest stosowanie preparatu co miesiąc. W uprawach polowych zalecane jest stosowanie na wiosnę oraz na jesień.

PRZECHOWYWANIE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Preparat BORA należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w szczelnym opakowaniu. Okres przechowywania preparatu BORA wynosi 2 lata w temperaturze poniżej 5°C i do 6 miesięcy w temperaturze pokojowej. Unikać przechowywania w temperaturze powyżej 25°C.

Preparat BORA można mieszać w zbiorniku z nawozami, herbicydami, preparatami owadobójczymi, ale nie wolno mieszać w zbiorniku z fungicydami. Sprzęt stosowany do aplikacji zawiesiny nie może zawierać pozostałości środków grzybobójczych.

Fungicydy można bezpiecznie stosować na polu poddanym działaniu preparatu BORA, po uwolnieniu składnika aktywnego do górnej warstwy gleby, tuż po mechanicznym wprowadzeniu roztworu do gleby lub po wystąpieniu minimum 10 mm opadów lub nawadnianiu.

Czas ponownego wejścia na teren po użyciu preparatu (prewencja): 0 dni
Okres przed zbiorami (karencja): brak
Klasyfikacja przeciwpożarowa: niepalny

Stosując się do przedstawionych wskazań, produkt można stosować zgodnie z jego przeznaczeniem. Gwarantujemy jakość produktu, ale nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się, przechowywaniem lub użytkowaniem. Producent/Dystrybutor zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody spowodowane przechowywaniem, obsługą lub użytkowaniem niezgodnym z zaleceniami podanymi na etykiecie.

Termin przydatności do użycia:

Data i seria produkcji: