

FoliQ CynBoFoS

Wieloskładnikowy, krystaliczny nawóz makro i mikroelementowy, będący doskonałym źródłem dla roślin **cynku, boru, fosforu i azotu**.

Produkt jest dedykowany kukurydzy i roślinom strączkowym, lecz z powodzeniem może być również stosowany w uprawach wykazujących zapotrzebowanie na wymienione wyżej składniki odżywcze. Bor zawarty w nawozie, wspomaga proces kwitnienia i kształtowanie nasion, natomiast cynk stymuluje syntezę białka biorącego udział w komunikacji roślin z bakteriami brodawkowymi oraz wpływa korzystnie na rozwój systemu korzeniowego. Występujący w produkcie fosfor jest istotny zwłaszcza na początku rozwoju roślin, gdy w uprawach kukurydzy zazwyczaj pojawiają się czerwono/fioletowe liście, oznaczające jego niedobór.

FoliQ CynBoFoS, jak każdy nawóz dolistny, warto stosować zapobiegawczo, jednak z racji zawartych w produkcie szybko działających form składników odżywczych, produkt sprawdza się również w nawożeniu interwencyjnym.

Krystaliczna formuła nawozu zapewnia właściwe pobranie przez rośliny zawartych w nawozie składników pokarmowych, nawet w warunkach atmosferycznych utrudniających ten proces, np. w niskich temperaturach.



FoliQ CynBoFoS	g/kg
Bor	30
Cynk	65
Fosfor (P ₂ O ₅)	190
Azot (N)	40

KLUCZOWE ZALETY:

- + połączenie boru, cynku i fosforu w jednym produkcie
- + odpowiednio zbilansowany skład niezbędny do prawidłowego wzrostu i plonowania roślin
- + produkt całkowicie rozpuszczalny w wodzie
- + produkt się nie zbryla

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

- + mocny, głęboko sięgający system korzeniowy
- + prawidłowa gospodarka azotem i pozostałymi makroelementami
- + intensywne kwitnienie roślin
- + liczne brodawki korzeniowe u roślin bobowatych
- + szybkie działanie interwencyjne w sytuacji pojawienia się czerwono-fioletowych liści w kukurydzy
- + zwiększona tolerancja na suszę
- + wyższa odporność na choroby
- + w pełni zaziarnione kolby kukurydzy
- + wyższa masa tysiąca ziaren
- + rośliny bardziej odporne na wyleganie
- + wyższa jakość i masa plonu

DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

Uprawa	Dawka kg/ha	Liczba zabiegów i terminy stosowania
Kukurydza	2,0	2 zabiegi: w fazie 4 – 10 liści w odstępach 7 – 10 dni
Strączkowe	2,0	2 zabiegi: od fazy kilku liści do fazy ukazywania się pąków kwiatowych