



Główne zalety produktu

- + Szybki efekt działania
- + Szerokie okno aplikacji
- + Ekspresowe pobieranie substancji aktywnych przez chwasty
- + Zwalcza wiele uciążliwych chwastów, m.in. bodziszkowate, mak polny, jasnoty, przytulię czepną i chwasty z rodziny kapustowatych

Rozwiązanie na Twoje najtrudniejsze w rzepaku wyzwanie

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne: halauksyfen metylu oraz pikloram zaliczane są do grupy O.

Środek pobierany jest poprzez liścienie i liście chwastów, a następnie szybko przemieszcza się w roślinie. Pierwszym objawem działania herbicydu jest zahamowanie wzrostu. Następnie chwasty ulegają deformacji, powstają chlorozy prowadzące do nekroz i zamierania. Objawy wizualne zależą od gatunków chwastów i mogą pojawić się od kilku dni do kilku tygodni po zabiegu.



Substancja aktywna

halauksyfen metylu – Arylex™ 10 g/l
pikloram – 48 g/l

Maksymalna dawka

- w fazie 2 - 4 liści właściwych rzepaku (BBCH 12-14) - 0,25l/ha
- w fazie 6 – 8 liści właściwych rzepaku (BBCH 16-18) - 0,5 l/ha

Uprawy

rzepak ozimy

MOZZAR



Rozwiązanie na Twoje najtrudniejsze w rzepaku wyzwanie

- + Szybki efekt działania
- + Szerokie okno aplikacji
- + Ekspresowe pobieranie substancji aktywnych przez chwasty
- + Zwalcza wiele uciążliwych chwastów, m.in. bodiszkowate, mak polny, jasnoty, przytulię czepną i chwasty z rodziny kapustowatych

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

www.agrii.pl



Agrii™